

# アースガーデン ケムシ撃滅 1000ml

## ■適用害虫と適用作物

作物名	適用病害虫名	使用時期	本剤の使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数
樹木類 (つつじ類、つばき類を除く)	ケムシ類、うどんこ病	発生初期	3回以内	5回以内	3回以内
つつじ類	ケムシ類、ツツジグンバイ、うどんこ病	発生初期	3回以内	5回以内	3回以内
つばき類	ケムシ類、うどんこ病	発生初期	3回以内	5回以内（株元灌注は2回以内）	3回以内
トマト／ミニトマト	コナジラミ類、葉かび病	収穫前日まで	2回以内	5回以内（培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）	3回以内
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病	収穫前日まで	2回以内	3回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）	3回以内
ピーマン	アブラムシ類、うどんこ病	収穫前日まで	2回以内	3回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）	3回以内
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、ウリハムシ、うどんこ病	収穫前日まで	2回以内	4回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内）	3回以内
ねぎ	アザミウマ類、さび病	収穫3日前まで	2回以内	4回以内（は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）	4回以内（株元灌注は2回以内、散布は2回以内）
ブロッコリー	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内（定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内）	3回以内
オクラ	アブラムシ類	収穫前日まで	2回以内	3回以内（株元散布は1回以内、散布は2回以内）	3回以内
キャベツ	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内（育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内）	3回以内
はくさい	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内（定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内）	3回以内
レタス／非結球レタス	アブラムシ類	収穫3日前まで	2回以内	4回以内（は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内）	3回以内
豆類（未成熟、ただし、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう及び未成熟さやげを除く）	アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	3回以内

作物名	適用病害虫名	使用時期	本剤の使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ペンチオピラドを含む農薬の総使用回数
未成熟ささげ	アブラムシ類	収穫前日まで	2回以内	2回以内	3回以内
さやいんげん/さやえんどう/実えんどう	アブラムシ類	収穫前日まで	2回以内	3回以内（株元散布は1回以内、散布は2回以内）	3回以内
すいか	アブラムシ類	収穫7日前まで	2回以内	4回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内）	3回以内
メロン	コナジラミ類	収穫3日前まで	2回以内	3回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内）	3回以内
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病	発生初期	3回以内	5回以内（土壌混和は1回以内）	3回以内
花き類・観葉植物（ばらを除く）	アブラムシ類、うどんこ病	発生初期	3回以内	5回以内（土壌混和は1回以内）	3回以内
かんきつ	ミカンハモグリガ	収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
うめ	アブラムシ類	収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
りんご	アブラムシ類、うどんこ病	収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
なし	ケムシ類、うどんこ病	収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
ぶどう	コナカイガラムシ類、さび病	収穫7日前まで	3回以内	3回以内（塗布は1回以内）	3回以内
かき	コナカイガラムシ類	収穫前日まで	3回以内	4回以内（塗布は1回以内、散布は3回以内）	3回以内
もも	アブラムシ類	収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
おうとう	カメムシ類	収穫前日まで	2回以内	2回以内	3回以内

【成分】：ジノテフラン〔(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン〕:0.010%

ペンチオピラド〔(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド〕:0.010%

水・界面活性剤等：99.98%

【性状】：類白色水和性懸濁液体

【農薬の種類】：ジノテフラン・ペンチオピラド水和液

【農林水産省登録】：第23372号

**殺虫殺菌剤(家庭園芸用)**