

適用害虫と適用作物

適用雑草と使用方法

作物名	使用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
野菜類 (①) を除く	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	1回
アスパラガス、オリーブ (葉)、きゅうり、しゃく やく(薬用)、たらんき、 トマト、なす、びわ (葉)、ほうれんそう、レ タス	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	3回以内
とうがらし類、にんじん、 ピーマン	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	1回
キャベツ	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	2回以内
だいこん	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	2回以内
はつかだいこん	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	1回
薬用にんじん	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	10回以内 (1年に2回以内)
ねぎ、たまねぎ	—	一年生雑草	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
ねぎ、たまねぎ	—	一年生雑草	定植後畦間処理但し、 収穫30日前まで(雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
えだまめ	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
だいず	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	1回	雑草茎葉散布	1回
だいず	—	一年生雑草	は種後出芽前まで (雑草生育期)	50ml/m ² (原液散布)	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
だいず	—	一年生雑草	畦間処理(雑草生育期) 但し、収穫前日まで	50ml/m ² (原液散布)	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内

作物名	使用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
かんしょ	－	一年生雑草	は種7日前まで（雑草生育期）	50ml/m ² （原液散布）	1回	雑草茎葉散布	2回以内
果樹類（かんきつ、パイナップルを除く）	－	一年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期）	50ml/m ² （原液散布）	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
果樹類（かんきつ、パイナップルを除く）	－	多年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期）	50～100ml/m ² （原液散布）	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
かんきつ	－	一年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期）	50ml/m ² （原液散布）	3回以内	雑草茎葉散布	5回以内
かんきつ	－	多年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期）	50～100ml/m ² （原液散布）	3回以内	雑草茎葉散布	5回以内
樹木類	－	一年生雑草	雑草生育期	50ml/m ² （原液散布）	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
樹木等	②	一年生雑草	雑草生育期	50ml/m ² （原液散布）	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
樹木等	②	多年生雑草	雑草生育期	100ml/m ² （原液散布）	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内

①：えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、どうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、アスパラガス、オリーブ（葉）、きゅうり、しゃくやく（薬用）、たらきのき、トマト、なす、びわ（葉）、ほうれんそう、レタス、薬用にんじん

②：公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等

【使用できる場所の例】

野菜まわり、果樹まわり、庭木まわり