

ネコソギWクイック

実際に使用する際は必ず商品ラベルをよく読み、記載内容に従ってお使いください。

農林水産省登録 第 21993 号

農薬の名称 ネコソギWクイック

農薬の種類 グリホサートイソプロピルアミン塩・フルミオキサジン粉粒剤

成分

- ・グリホサートイソプロピルアミン塩・・・3.0%
[イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート]
- ・フルミオキサジン・・・・・・・・・・0.10%
[N-(7-フルオロ-3,4-ジヒドロ-3-オキソ-4-プロパ-2-イニル-2H-1,4-ベンゾキサジン-6-イル)シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシミド]
- ・ 鉱物質微粒等・・・・・・・・96.9%

性状 類白色微粒

適用雑草と使用方法

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 使用方法 | 総使用回数 ※ |
|------|--|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| つつじ類 | — | 一年生雑草 | 雑草 生育期 | 10~20 g/m ² | 雑草 茎葉散布 | 3回以内 |
| 樹木等 | 公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 鉄道等 | 多年生 広葉雑草 | | 20~30 g/m ² | 植栽地を除く 樹木等の 周辺地に雑 草茎葉散布 | |

※は本剤及びグリホサート、フルミオキサジンを含む農薬を、年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示す。

- 枯れやすい一年生雑草には1㎡当り 10~20g (1坪当り 33~66g)、しつこい多年生広葉雑草には1㎡当り 20~30g (1坪当り 66~99g) を、本剤が雑草の葉や茎に付着するように散布します。
- 朝露がおりたときや降雨の後など、雑草の茎葉が湿っている状態で散布してください。本剤がよく付着するので効果が高まります

効果・薬害等の注意

- 雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草の草丈が 50cm 以下の生育期に散布する。
- 雑草の茎葉が湿った状態で使用する（効果）
- 作物の茎葉に付着すると薬害を生ずるので、かからないよう十分注意して散布する。
- 播種予定地では使用しない（薬害）
- 強風時の散布は薬剤が飛散して、周囲の植物に薬害を生ずるおそれがあるのでさける。
- 散布後の多量の降雨は効果にむらを生じたり、有用植物に薬害を生ずるおそれがあるので、天候を見極めてから散布する。
- 本剤が水田に流入すると、稲が枯れるので十分注意する。
- ハウス等の施設内及びその周辺では使用しない。[施設内使用禁止マーク]
- 急な傾斜地では使用しない。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。
- 自動車、カートをタン、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないように注意する。
- 使用量に合わせ秤量し、使い切る。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器は環境に影響のないよう適切に処理する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病虫害防除所または販売店と相談することが望ましい。

安全使用上の注意

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。[マスク着用マーク]
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

魚毒性等・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する（藻類）

保管・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。